


РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ПРОФ. ДР СРЂАН ЂУРЂЕВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГ – АКУШЕР

РЕДОВНИМ ПРЕГЛЕДИМА ПРОТИВ РАКА

- Сваке године од рака грлића материце умире око 400 жена
- Велику улогу у раном откривању оболевања грлића материце играју превентивни гинеколошки прегледи
- Хумани папилома вирус (ХПВ) један је од главних узрочника појаве рака грлића материце
- У Србији је доступна бесплатна вакцинација против хуманог папилома вируса, али је одзив за имунизацију слаб



Проф. др Срђан Ђурђевић

КАДА СЕ ЈАВИТИ ГИНЕКОЛОГУ?

Према речима проф. др Срђана Ђурђевића, жене би требало да хитно посете гинеколога уколико приметите необично крварење које се јавља између циклуса, после менопаузе или после сексуалног односа. Поред тога, гинекологу је потребно јавити се и уколико се примети појачан исцедак, губитак на тежини, умор и губитак апетита, нелагодност, отицање ногу или сталну бол у леђима, ногама или карлици.

Последња недеља јануара протекла је у знаку обележавања Европског дана борбе против рака грлића материце, али ова тема заслужује сталну пажњу, поготово ако се узме у обзир да је Србија на 5. месту у свету по броју оболевања и умирања од карцинома грлића материце.

У Србији се годишње открије око 1.400 нових случајева рака грлића материце, а сваке године од ове болести умире око 400 жена. Истраживања су показала да ће у Аутономној Покрајини Војводини свака 46. жена старости од 44 до 46 година, оболети од ове болести. О томе како настаје рак грлића материце, какав је ток лечења, али и да ли постоји превенција и у чему се огледа, разговарали смо са проф. др Срђаном Ђурђевићем, специјалистом гинекологом-акушером у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Хумани папилома вирус (ХПВ) један је од главних узрочника појаве рака грлића материце, а представља најчешће преносиву полну инфекцију. Готово сви сексуално активни људи овом инфекцијом биће заражени једном у животу.

- Откривено је више од 200 различитих ХПВ типова од којих 40 могу изазвати промене на

полним органима жене. Најопаснији су ХПВ типови високог онкогеног потенцијала (16, 18, 31, 33 и други). У већини случајева имуни систем сам уклања овај вирус из тела, но ипак, дуготрајна инфекција ХПВ-ом високог ризика, коју има око 8 одсто свих жена, може изазвати развој аб-

процес може бити бржи и трајати 5-10 година – рекао је проф. др Срђан Ђурђевић.

РЕДОВНИ ОДЛАСЦИ КОД ГИНЕКОЛОГА СУ ОБАВЕЗА СВАКЕ ЖЕНЕ

Важно је напоменути да промене које претходе раку грлића материце ретко када изазивају

одласцима на гинеколошке прегледе.

- Када је реч о раном откривању рака грлића материце, издвајају се две групе жена. Прву групу чине млађе жене са навиком јављања на редовне гинеколошке прегледе. Код њих се евентуално присутна болест открива на време у раној или преканцероз-

колошки преглед представљају кључни корак у даљем лечењу – истакао је професор.

Додао је да жене треба да се прегледају на рак грлића материце сваких пет година почевши од навршене 30. године живота. Комплетан преглед обухвата контролу цитолошког Папаниколау теста, колпоскопски

терице може се превентирати, а најбоље начин за то јесте примена вакцине против хуманог папилома вируса.

- У Србији је данас широко доступна најмодернија деовалентна ХПВ вакцина, која пружа заштиту у преко 93 одсто случајева. Вакцинишу се девојчице и дечаци пре

ВАКЦИНУ ПРИМИЛО ТЕК НЕКОЛИКО СТОТИНА МЛАДИХ

Из Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“, где сва деца узраста од 9 до 19 година могу потпуно бесплатно примити вакцину против ХПВ-А, кажу да је одзив грађана за имунизацију слаб.

- Почевши од јуна 2022. године па до данас, апликовали смо укупно 610 доза вакцине, од тога око 300 првих доза, те можемо рећи да је одзив грађана спорадичан – казали су из Службе за здравствену заштиту школске деце Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“. Вакцина се може примити сваког дана у поменутој служби Дома здравља, а заказивање се врши позивом на број телефона 414-228.

Након обавезног прегледа педијатра, родитељ, законски заступник, или дете самостално (уколико је старије од 15 година), потписује сагласност за примање вакцине.

нормалних ћелија, које даље постају рак. ХПВ инфекција грлића материце, која дуго траје и не лечи се, узрокује чак 98 одсто карцинома грлића материце. Уобичајено је потребно од 15 до 20 година да абнормалне ћелије постану рак, али код жена са ослабљеним имуним системом овај

симптоме, те велику улогу у раном откривању оболевања грлића материце играју превентивни гинеколошки прегледи. Ипак, чини се да је одређени број жена занемарио ову „обавезу према себи“, па у складу са тим, проф. др Ђурђевић издваја две групе жена када је реч о редовним

ној фази и успешно лечи. Другу групу чине жене које уопште не иду или веома ретко иду на гинеколошке прегледе. Међу њима се издвајају оне које ће се јавити ако примете симптоме и оне које ће симптоме рака грлића материце у потпуности занемарити. Препознавање симптома и гине-


преглед грлића материце под увеличањем, контролу бриса на ХПВ и биопсију грлића са патохистолошким прегледом.

ПРЕВЕНЦИЈА ПОСТОЈИ

Ова тешка болест може бити спречена! Појава рака грлиће ма-

ступања у полне односе, а најбоље у 12. години живота. Вакцина је апсолутно безбедна и нема озбиљних nuspojava, осим благих симптома као што су бол и црвенило, оток на месту инјекције, који брзо пролазе – објаснио је проф. др Ђурђевић.

С. М.



Хумани папилома вирус